



## ＜新1年生＞

- 保健調査票  日本スポーツ振興センター同意書
  - 色覚検査(希望者)  与薬依頼書(対象者)
  - 医療的配慮, アレルギー・心臓・腎臓管理指導表
- 合格発表・説明会で配付済み

## ＜2・3年生＞

- 医療的配慮, アレルギー・心臓・腎臓管理指導表

→ H31.2月に対象者にはお知らせ済み

- 与薬依頼書

お登に薬を飲む必要があり、与薬の介助を希望する場合は、提出をお願いします。

- 保健調査票

保護者会、個人面談等が必要に応じて訂正して頂きます。


赤のボールペンをお持ちください。特に、緊急連絡先は、必ず連絡のとれる番号を記入してください。

## 保護者の皆様へ

高校生になると、親も子ども自身も「自分のことは自分でやる」という気持ちになります。

でも、ツメを切り、歯をみがいたり、できているようで、できていないこともあります。時々で良いので、「お子さんのツメがきちんと切れているか」、「歯をきれいにみがけているか」などを、たしかめて頂きたいと思えます。

ぜひ、よろしくお願ひします。



## ＜お知らせ＞

# 麻疹（はしか）は ワクチン接種が予防に有効です！

麻疹は、麻疹ウイルスが感染しておこる感染症で、発熱や発疹などが主な症状です。麻疹は感染力が強く、空気感染もするので、日頃から麻疹のワクチン（一般的にはMRワクチン）を受けていることが、予防に最も有効です。

## 定期接種を受けましょう！

### 《定期接種を受けましょう》

- ◎ ワクチンを1回接種することで、95%以上の方が麻疹に対する免疫がつくと言われています。
- ◎ 確実な免疫を得るためには、99%以上の方が免疫がつくとされる2回の接種がのぞましいとされています。
- ◎ 接種歴は、母子健康手帳で確認できます。

### 《ワクチンを接種した方がいい？》

- 1歳児と小学校入学前1年間の幼児は、定期接種の対象です。期間内に接種することを積極的にお勧めします。
- 過去に麻疹と診断され、検査で確認されたことがある方は、免疫がついていると考えられることから、ワクチンを接種する必要はありません。
- 過去に麻疹と診断されたこともワクチン接種を受けたこともない方は、母子健康手帳を確認の上、医療機関にご相談ください。

### 《以下、特にご注意ください》

- 過去に麻疹と診断されたこともワクチン接種を受けたこともない方で、麻疹患者と接触し、1～2週間（約10日間）経ってから発熱、せき、のどの痛み、眼が赤くなるなどの症状が出てきたら、麻疹の可能性があります。麻疹の可能性が旨、事前に医療機関へ連絡してから受診するようにしてください。



麻疹・風しん  
(厚生労働省)

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakujiryoku/a/kenkyu/kenkou/kenkou-kanzenhou/kekaku-senshou21/index.html>



麻疹（はしか）に関する  
Q&A (厚生労働省)

<http://www.mhlw.go.jp/qa/kenkou/ashika/index.html>



麻疹とは  
(国立感染症研究所)

<http://www.nih.go.jp/nihl/ja/disease/s/ma/measles.html>